



2024 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题（B 卷）

招生专业与代码：护理/护理学

105400/101100

考试科目名称及代码：护理综合 308

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、单项选择题（下列每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最合适的答案写在答题纸上，共 40 题，每题 2 分，共 80 分）

1. 患者张某，男，58 岁，由车祸导致颅脑损伤，颅内压增高。护士查体发现：患者 T38.5℃，R 8 次/分、节律异常，如潮水般起落，P 58 次/分，BP160/90mmHg。该患者的脉搏属于（ ）
A. 间歇脉
B. 洪脉
C. 交替脉
D. 缓脉
E. 丝脉
2. 护士在观察王先生口腔时，发现口腔黏膜有一处感染溃烂，应为其选用的口腔护理溶液是（ ）
A. 生理盐水
B. 复方硼酸溶液
C. 0.1%醋酸溶液
D. 3%过氧化氢溶液
E. 4%碳酸氢钠溶液
3. 患者任某，女，43 岁，子宫全切除术后 3 天，出现腹胀、便秘，最佳的灌肠方法是（ ）
A. 0.1%肥皂水清洁灌肠
B. 甘油加温开水小量不保留灌肠
C. 2%小檗碱保留灌肠
D. 0.2%肥皂水大量不保留灌肠
E. 0.9%氯化钠溶液大量不保留灌肠
4. 患者王某，女，30 岁，阑尾炎术后第五天，T 36.3℃，伤口无渗血渗液。上午 9 时，继续静脉输注青霉素，半小时后，患者突然寒战，继之高热，T 40℃，并伴有头痛、恶心、呕吐。此患者可能出现了哪种情况？（ ）
A. 发热反应
B. 过敏反应
C. 心脏负荷过重反应
D. 空气栓塞
E. 静脉炎
5. 患者余某，男，56 岁，农民。1 小时前与人争吵后出现剧烈头痛，自测血压为 190/120mmHg，急诊入院。患者 3 年前清晨起床后头痛、呕吐，诊断为高血压，一直间断服药，血压控制不详。平素嗜好吸烟、饮酒。此患者首选的降压药物是（ ）
A. 硝普钠

- B. 硝酸甘油
C. 尼卡地平
D. 拉贝洛尔
E. 硝苯地平
6. 患者张某，男，55岁，与护士谈论他的病情时说：“我最近头昏得厉害，估计贫血更严重了”，患者与护士沟通属于哪个层次（ ）
A. 一般性沟通
B. 事务性沟通
C. 分享性沟通
D. 情感性沟通
E. 共鸣性沟通
7. 张某，男，32岁，初到美国，其在住房和交通问题上遭遇挫折，萌生了回国的念头，这种表现属于文化休克的（ ）
A. 蜜月阶段
B. 沮丧或敌意阶段
C. 恢复调整阶段
D. 适应阶段
E. 默认阶段
8. “喜伤心、怒伤肝、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾”之说说明了哪种因素对健康产生的影响（ ）
A. 生物因素
B. 心理因素
C. 环境因素
D. 行为与生活方式
E. 卫生服务系统
9. 患儿李某，7个月，足月顺产，因腹泻住院治疗。其母亲诉说患儿是人工喂养，胃口不好、经常哭闹。根据艾瑞克森的心理社会发展理论，该患儿此期发展的危机是（ ）
A. 信任对不信任
B. 自主对羞怯
C. 主动性对内疚
D. 勤奋对自卑
E. 亲密对孤独
10. 患者廖某，女，65岁，患高血压20年。参加家庭聚会时突然出现剧烈头痛、头晕、呕吐，进而迅速意识障碍，BP 210/110mmHg，CT显示高密度影。如果患者出现双侧瞳孔不等大，且对光反射迟钝或消失，应立即采取的措施是（ ）
A. 快速静脉滴注甘露醇
B. 气管插管
C. 气管切开
D. 头部置冰袋，降低脑代谢
E. 应用神经活化素
11. 患者陈某，男，60岁，慢性便秘多年。近半年来站立时发现阴囊出现肿块，平卧时可还纳，入院诊断为腹股沟斜疝，拟行手术治疗。对患者的术前护理措施不正确的是（ ）
A. 应积极消除患者的便秘
B. 按下腹部手术备皮范围进行皮肤准备
C. 用肥皂水灌肠，清洁肠道

- D. 术前留置胃管
E. 入手术室前应排空膀胱
12. 患者钱某，女，52岁，因发热、咳嗽入院，诊断为“肺炎”，经过治疗护理后进入恢复期，但仍害怕出院后病情加重或恶化，此患者属于哪种角色适应不良（ ）
- A. 角色行为冲突
B. 角色行为强化
C. 角色行为缺如
D. 角色行为消退
E. 角色行为异常
13. 闭合性多根多处肋骨骨折导致呼吸困难的主要原因是（ ）
- A. 反常呼吸运动
B. 剧痛不敢呼吸
C. 肺不张
D. 继发肺部感染
E. 血容量不足
14. 低蛋白饮食每日蛋白质的供应量应低于（ ）
- A. 20g/d
B. 30g/d
C. 40g/d
D. 50g/d
E. 60g/d
15. 患者王某，男，66岁，胃手术后第2日，血清钾 2.9 mmol/L。下面哪项不是引起该患者低血钾的原因（ ）
- A. 输入大量葡萄糖液体
B. 腹泻、呕吐
C. 持续胃肠减压
D. 代谢性酸中毒
E. 禁食
16. 为预防术后患者深静脉血栓形成，下列措施不正确的是（ ）
- A. 早期床上活动
B. 尽早离床活动
C. 下肢用弹性绷带或穿弹性袜
D. 给予溶栓药物
E. 给予抗凝药物
17. 下列何种颅脑损伤可表现为典型的“熊猫眼”征（ ）
- A. 顶骨骨折
B. 颅前窝骨折
C. 颅中窝骨折
D. 颅后窝骨折
E. 硬膜下血肿
18. 对急性肠梗阻行肠切除肠吻合术后早期的患者，以下护理措施正确的是（ ）
- A. 绝对卧床, 制动
B. 低盐、低脂饮食
C. 胃肠减压

- D. 及早进食
E. 灌肠
19. 患者朱某,女,70岁,手术后可自主咳嗽,但痰黏稠,不易咳出,最有效的护理措施是()
A. 雾化吸入
B. 加强活动
C. 戒烟
D. 给予抗生素
E. 给镇咳药物
20. 患者陈某,62岁,因胆道结石、胆道感染致休克,正在快速输液治疗。监测患者 CVP 10cmH₂O, BP 80/60mmHg,此时应采取的处理措施()
A. 充分补液
B. 给强心药
C. 纠正酸中毒
D. 舒张血管
E. 补液试验
21. 患者刘某,男,68岁,因肾功能衰竭拟行肾移植术,术前饮食宣教正确的是()
A. 高蛋白
B. 高维生素
C. 低糖、低热量
D. 低钠无盐
E. 富含水分的食物
22. 在患者胸腔闭式引流时,水封瓶不慎侧翻,此时首先()
A. 将胸腔导管返折捏紧
B. 自己守护患者,请他人去拿血管钳夹闭
C. 立即报告医师
D. 握紧胸腔导管
E. 给患者吸氧
23. 以下有利于乳腺癌根治术后患者伤口愈合的护理措施是()
A. 鼓励患者咳嗽
B. 半卧位
C. 活动患肢
D. 保持皮瓣负压吸引通畅
E. 早期下床活动
24. 在多发伤性损伤的急救处理中,应首先处理的紧急情况是()
A. 张力性气胸
B. 四肢骨折
C. 肺挫伤
D. 肋骨骨折
E. 肾挫伤
25. 患者李某,女,35岁,行门静脉高压分流术后第一天,以下护理措施不正确的是()
A. 48小时内平卧位
B. 给予高蛋白饮食
C. 1周后下床活动
D. 忌用肥皂水灌肠

- E. 保持大便通畅
26. 肝癌患者行肝叶切除术，术后 24 小时内应重点观察的并发症是（ ）
- A. 肺部感染
B. 肝脓肿
C. 酸中毒
D. 出血
E. 腹腔感染
27. 患儿，女，6 个月，患 II 度烧伤，每 1% 烧伤面积、每千克体重补充体液量为（ ）
- A. 1ml
B. 1.5ml
C. 2ml
D. 2.5ml
E. 3ml
28. 破伤风患者应用破伤风抗毒素的目的是（ ）
- A. 中和游离毒素
B. 杀死破伤风梭菌
C. 抑制破伤风梭菌生长
D. 清除毒素来源
E. 分离与神经结合的毒素
29. 患者刘某，男，70 岁，COPD 病史 30 年，3 天前着凉后出现发热，咳嗽加重，咳黄脓痰，伴呼吸困难，不能平卧，今早患者出现嗜睡，表情淡漠，被家属送至医院。身体评估：T 39.0°C，P 110 次/min，R 30 次/min，BP150/90mmHg。两肺闻及湿啰音并有散在哮鸣音。动脉血气分析结果：在未吸氧的情况下，PaO₂ 50mmHg，SaO₂ 84%，PaCO₂ 78mmHg，pH7.30。此患者可能的诊断是（ ）
- A. 急性重症肺炎
B. 哮喘急性发作
C. I 型呼吸衰竭
D. II 型呼吸衰竭
E. 急性呼吸窘迫综合征
30. 下列哪项是预防风湿性心脏病加重的主要措施（ ）
- A. 积极治疗心衰
B. 积极锻炼身体
C. 清淡饮食
D. 预防和治疗链球菌感染
E. 外科手术
31. 胃镜检查时患者应采取的体位是（ ）
- A. 左侧卧位双腿伸直
B. 左侧卧位双腿屈曲
C. 右侧卧位双腿伸直
D. 右侧卧位双腿屈曲
E. 俯卧位
32. 下列哪项是肾病综合征患者必行的尿液检查（ ）
- A. 尿常规
B. 尿渗透压

- C. 尿微量蛋白测定
D. 24 小时尿蛋白定量
E. 尿沉渣分析
33. 下列哪项是导致血液病患者发热最常见的原因 ()
A. 出血
B. 贫血
C. 继发感染
D. 癌性发热
E. 化疗后反应
34. 患者李某, 男, 20 岁, 因“突发右侧肢体瘫痪 1 小时”入院。身体评估: 患者处于沉睡状态, 大声呼唤能唤醒, 可做含糊、简单而不完全的答话, 停止刺激后很快入睡。该患者的意识障碍属于 ()
A. 意识模糊
B. 嗜睡
C. 昏睡
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
35. 患者王某, 女, 35 岁, 诊断为急性再生障碍性贫血入院。患者突发头痛、头晕、视力模糊、呼吸急促, 继而昏迷。考虑该患者最有可能发生的是 ()
A. 高血压危象
B. 颅内出血
C. 脑梗死
D. 脑动脉痉挛
E. 高血压脑病
36. 下列哪种化疗药物的不良反应是出血性膀胱炎 ()
A. 甲氨蝶呤
B. 阿糖胞苷
C. 长春新碱
D. 环磷酰胺
E. 柔红霉素
37. 患者李某, 女, 62 岁, 因全身不明原因疼痛 1 年入院, 诊断为骨质疏松症。对该患者的饮食指导, 以下哪项是错误的 ()
A. 低盐饮食
B. 高钙饮食
C. 高动物蛋白饮食
D. 忌喝咖啡
E. 戒酒
38. 患者杨某, 女, 27 岁, 系统性红斑狼疮病史 2 年, 近日出现体温升高, 关节红肿有压痛、面部红斑及泡沫尿入院治疗。护理措施中正确的是 ()
A. 加强肢体锻炼
B. 安排在朝阳的病室
C. 给予高蛋白、高热量饮食
D. 遵医嘱强化激素治疗
E. 使用洗面奶勤洗脸

39. 患者胡某,男,45岁,患有类风湿关节炎1年。近几天来手、足及膝关节肿胀,疼痛加重。能较客观判断类风湿关节炎炎症活动的指标是()
- A. 晨僵
 - B. 关节痛
 - C. 关节肿胀
 - D. 类风湿结节
 - E. 指关节偏向尺侧
40. 患者陈某,女,34岁,患乳腺癌接受了乳腺癌根治术。术后患者有自卑感,不愿见人,不与人交流,根据马斯洛的人类基本需要层次论,此时护士应考虑到其()
- A. 生理需要
 - B. 安全需要
 - C. 爱与归属的需要
 - D. 尊重的需要
 - E. 自我实现的需要

二、多项选择题(下列每道题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择所有正确的答案写在答题纸上,多选或少选均不得分,共10题,每题2分,共20分)

1. 患者王某,女,30岁,因股骨干骨折入院后行牵引治疗。下列护理注意事项中正确的是()
- A. 抬高床尾15~30cm
 - B. 牵引绳不可受压
 - C. 牵引重量不可随意增减
 - D. 牵引力与反牵引力保持在一条线上
 - E. 牵引肢体的足部不能抵住床栏
2. 颅内压增高的三主征是()
- A. 视神经乳头水肿
 - B. 剧烈头痛
 - C. 血压升高
 - D. 脉搏增快
 - E. 频繁呕吐
3. 压力源是指任何个体产生压力反应的刺激因素,一般分为()
- A. 躯体性
 - B. 心理性
 - C. 社会性
 - D. 文化性
 - E. 技术性
4. 下列胆道T管的护理措施中,正确的是()
- A. 妥善固定
 - B. 保持通畅
 - C. 每天按时冲洗
 - D. 每周更换引流袋
 - E. 记录引流量和性质
5. 以下哪几种药物常用于控制高血压()
- A. β 受体拮抗药
 - B. 钙通道阻滞药

- C. 利尿药
D. 血栓溶解药
E. 血管紧张素转化酶抑制剂
6. 患者李某，男，57岁，因腹痛、腹泻呈水样便1天入院，诊断为“急性肠炎”，患者急性病容，精神差，T 39.5℃。护士为其收集的资料中，其中属于客观资料的是（ ）
- A. T 39.5℃
B. 粪便稀黄，含有少量脓血
C. 腹部隐隐作痛
D. 呕吐物有酸臭味，量约250ml
E. 害怕
7. 人工起搏器安装的术后护理包括（ ）
- A. 经股静脉安置临时起搏器的患者需绝对卧床
B. 描记12导联心电图
C. 伤口局部加压6小时
D. 观察有无局部疼痛、皮肤变暗发紫、波动感
E. 常规应用抗生素预防感染
8. 患者陈某，男，32岁。因右肾下极巨大结石行体外震波碎石，下列术后护理措施正确的是（ ）
- A. 多饮水
B. 取患侧卧位
C. 指导患者早期行跳跃运动
D. 观察疼痛和血尿情况
E. 观察排石情况
9. 患者李某，女，32岁，因颅脑损伤入院。患者感剧烈头痛，频繁呕吐，行腰椎穿刺测得颅内压为18mmHg，以下护理措施正确的是（ ）
- A. 限制水钠摄入量
B. 便秘时可给予缓泻剂
C. 氧气吸入
D. 保持室内安静
E. 应用脱水剂
10. 患者李某，男，42岁，因肾癌拟行根治性肾切除术，术前护理措施包括（ ）
- A. 贫血严重的患者注意营养摄入
B. 注意患者尿液颜色的变化
C. 进行床上排尿训练
D. 观察有无膀胱刺激症状
E. 注意引起低热原因的鉴别和观察

三、问答题（共4题，每题15分，共计60分）

1. 试述如何培养及促进护士的沟通交流技巧。
2. 试述保护性隔离的适应人群及具体措施。
3. 试述保持COPD患者呼吸道通畅的护理措施及健康教育。
4. 试述血栓闭塞性脉管炎的临床表现及处理原则。

四、分析题（共 5 题，共 140 分）

1. 护士小张刚从护理院校毕业参加工作，他希望自己能够很好地应用评判性思维分析解决患者问题。在工作中，小张护士努力、勤奋，他确信临床护理专家对每个问题都有正确答案，在对患者进行护理时，严格参照操作的规范程序手册，遵循操作步骤依次予以执行。小张对自己的工作非常满意，但是患者却认为小张不能很好满足自己的健康需求。

请问：

- (1) 你认为护士小张的评判性思维可能处于哪个层次，为什么？（10 分）
- (2) 护士小张应该如何提高自己的评判性思维层次？（10 分）
- (3) 哪些因素可能会影响到护士小张评判性思维的发展？（10 分）

2. 患者陈某，男，48 岁，因发作性胸痛 2 年，加重 3 小时急诊入院。该患者 2 年前劳累时出现心前区疼痛，持续 5 分钟左右，无放射，休息后可缓解，未重视，此后偶有类似发作。3 小时前再因劳累出现上述症状。身体评估：P 76 次/min，BP 130/80mmHg，神志清楚，双肺呼吸音清，于胸骨左缘 3、4 肋间可闻及粗糙的收缩期杂音，心尖部可闻及 II 级收缩期杂音，腹软，下肢无水肿。心电图：窦性心律，I、aVL 呈 QR 型，Q 波时限 0.03 秒，T 波 $V_3 \sim V_5$ 呈深倒置，心脏超声：舒张期室间隔厚度与后壁之比为 1.5:1。

请问：

- (1) 该患者最可能的疾病诊断是什么？（5 分）
- (2) 针对患者的胸痛，可采取哪些护理措施？（10 分）
- (3) 如何对该患者进行健康指导？（10 分）

3. 患者张某，男，36 岁，因车祸内脏破裂大出血拟行急诊手术治疗。手术前护士遵医嘱为患者建立了一个静脉通道并行输血治疗。因时间紧迫，护士从血库取回血后，为了尽早将血输给患者，便将血袋放在热水中加温，5 分钟后给患者输入。10min 后，患者感到头部胀痛，并出现恶心呕吐，腰背部剧痛。

请问：

- (1) 此患者最可能出现了什么情况？并阐明原因？（10 分）
- (2) 患者接下来将出现的特征性表现是什么？（5 分）
- (3) 护士应该如何处理？（5 分）
- (4) 手术后一周，患者 ADL 评分 60 分，该患者的自理能力属于哪个级别？（5 分）

4. 患者王某，女，48 岁，公务员。主诉最近性情急躁，心慌，怕热多汗，夜间睡眠较差，易醒。体格检查：T 37.6℃，P 110 次/分钟，R 24 次/分，BP 130/70mmHg，甲状腺呈弥漫性肿大，质软，双手震颤，有轻度突眼，基础代谢率为 +45%、诊断：甲状腺功能亢进。

请问：

- (1) 请列出患者目前的主要护理诊断。（至少列出 3 项）（10 分）
- (2) 对患者术后护理措施有哪些？（10 分）
- (3) 如何对患者进行健康教育？（10 分）

5. 患者胡某，男性，45 岁，与朋友生日聚餐饮酒后出现剧烈而持续的中上腹疼痛并向腰背部呈带状放射，伴恶心呕吐，吐出食物和胆汁，发病 12 小时来诊，体查：患者急性痛苦面容，皮肤巩膜无黄染，T 38.2℃，P 110/分，R 24 次/分，BP 80/50mmHg，上腹部有压痛、肌紧张和反跳痛，移动性浊音（+）。辅助检查：RBC $5.3 \times 10^{12}/L$ ，HB120g/L，WBC $15.9 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶 286U/dl，以轻症急性胰腺炎收入院治疗。

请问：

- (1) 列出患者目前的主要护理诊断。(至少列出 3 项) (10 分)
- (2) 该患者的处理原则是什么? (10 分)
- (3) 对该患者的健康教育包括哪些? (10 分)